

2024

# Grasgids

turfgrass guide



[www.grasgids.nl](http://www.grasgids.nl)

- Sport  
• Sport
- Gazon  
• Lawns
- Recreatie  
• Landscaping
- Berm en dijk  
• Road verges  
and dikes
- Golfgreen  
• Golfgreen

## Grasgids

De Grasgids is een leidraad voor de toepassing van grasrassen en -mengsels voor sport,

gazon, recreatie, berm, dijk en golfgreen. Voor de Grasgids is gebruik gemaakt van gegevens uit vergelijkend rassenonderzoek uitgevoerd bij Wageningen University & Research, Open Teelten te Lelystad.

De Grasgids verschijnt jaarlijks in het vierde kwartaal. Vanaf uitgave 2021 is het enkel nog digitaal beschikbaar.

Mail: [info@plantum.nl](mailto:info@plantum.nl)

[www.grasgids.nl](http://www.grasgids.nl)

Ondanks alle zorgvuldigheid, is (zijn) auteur(s) niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, verband houdende met eventuele onjuistheden in deze uitgave.

### Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Plantum.

Titel: Grasgids 2024  
Copyright 2023, Plantum

## Inhoud

	pagina
<b>1 Grasgids</b> (Turfgrass Guide)	<b>4</b>
<b>2 Grassoorten</b> (Grass species)	<b>5</b>
<b>3 Grasmengsels</b> (Grass seed mixtures)	<b>8</b>
3.1 Oranjebandmengsel (oranjeband mixture)	8
3.2 Toepassing en samenstelling (amenity use and composition)	8
3.3 Sport (Sport)	9
3.4 Gazon (Lawn)	10
3.5 Recreatie (Recreation fields)	11
3.6 Berm (Road verges)	12
3.7 Dijk (Dikes)	12
3.8 Golfgreens (Golfgreens)	13
<b>4 Grasrassen</b> (Turfgrass cultivars)	<b>14</b>
4.1 Toepassing en beoordeling (Amenity use and evaluating)	14
4.2 Ziekten (Diseases)	15
4.3 Grasrassen voor sport (grass cultivars for sports fields)	18
4.4 Grasrassen voor gazon (grass cultivars for lawns)	20
<b>5 Kwekers en vertegenwoordigers van Grasgidsrassen</b> Dutch agents/ breeders of Turfgrass Guide cultivars	<b>26</b>
<b>English commentary and translation of terms</b>	<b>30</b>

# 1. Grasgids

Een natuurlijke grasmat is gezond en veilig voor de gebruikers en het is ideaal voor het milieu. Door voortdurende innovatie en vernieuwing bieden de kweekbedrijven natuurlijke grasoplossingen voor verschillende toepassingsgebieden en omstandigheden. Ook voor niet-ideale omstandigheden zoals schaduw, intensieve betreding en onvoldoende luchtcirculatie zijn geschikte rassen en mengsels beschikbaar. Door nieuwe ontwikkelingen in grasveldaanleg, drainage, voedingsprogramma's en expertise op het gebied van onderhoud kunnen natuurlijke grasmaten gemakkelijk aangebracht en onderhouden worden. Kortom: de keuze voor een natuurlijke grasmat is de beste lange termijn oplossing!

## Cultuur-en gebruikswaardeonderzoek

Ieder jaar wordt het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek Grasrassen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden jaarlijks door Plantum in de Grasgids gepubliceerd.

In de Grasgids zijn de grasrassen en -mengsels gerangschikt naar de volgende toepassingsgebieden:

- Sport
- Gazon
- Recreatie
- Berm en Dijk
- Golfgreen

De grondslag van de Grasgids is het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek Grasrassen. Dit onderzoek naar de kwaliteit van grasrassen valt onder de verantwoordelijkheid van Plantum. In dit onderzoek worden de nieuw ontwikkelde grasrassen vergeleken met de reeds opgenomen rassen in de Grasgids. Een grasras wordt in de Grasgids vermeld als aangetoond is dat de kwaliteit van dit nieuwe grasras gelijk is aan, of beter is dan de gemiddelde kwaliteit van het bestaande assortiment, binnen de soort.

## Leeswijzer

Een beschrijving van de grassoorten en hun geschiktheid voor de aangegeven toepassingsgebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2. De inzaai van grasvelden vindt doorgaans plaats met mengsels die bestaan uit verschillende grassoorten. Per toepassingsgebied staan in hoofdstuk 3 de aanbevolen mengsels beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de grasrassen per toepassingsgebied opgenomen.

Het merk Oranjebandmengsel® is in 2000 geïntroduceerd, dit is een kwaliteitsaanduiding van de gezamenlijke Nederlandse graszaadbedrijven. Een toelichting op het merk Oranjebandmengsel® is gegeven in hoofdstuk 3.1. Tot slot staan in hoofdstuk 5 de Nederlandse vertegenwoordigers/kwekers weergegeven van de grasrassen uit de Grasgids.

# 2. Grassoorten

Grassoorten hebben verschillende eigenschappen die ze meer of minder geschikt maken voor bepaalde toepassingsgebieden. De keuze van een grasoort voor een toepassingsgebied is afhankelijk van de eisen die de gebruiker eraan stelt.

In de tabel is een overzicht gegeven van de in de Grasgids vermelde grassoorten en hun geschiktheid voor de toepassingsgebieden. De waardering is weergegeven in cijfers van 1 t/m 10. Een hoog cijfer duidt op een betere geschiktheid voor het toepassingsgebied of een hoge waardering van de betreffende eigenschap.

Doorgaans worden diverse grassoorten tegelijkertijd toegepast in een mengsel. Voor de samenstelling van de mengsels voor de verschillende toepassingsgebieden wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Tabel 2.1 Overzicht verschillende grassoorten, toepassingsgebieden en eigenschappen.

	Toepassingsgebieden					Eigenschappen								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sport	Gazon	Recreatie	Berm en Dijk	Golfgreen	1000 korrelgewicht (g)	Opkomstnelheid	Bespelingstolerantie	Zodichtheid	Traagheid van groei	Tolerantie kort maaien	Droogtetolerantie	Wintervastheid	Schaduwtolerantie
a. Engels raaigras diploid	9	7	8	6	4	1,7	7	9	8	4	6	7	6	4
b. Engels raaigras tetraploid	8	6	7	6	2	2,2	8	8	7	3	5	7,5	6	4
c. Veldbeemdgras	8	8	8	7	5	0,3	2	8	9	7	6	8	10	5
d. Gewoon roodzwenkgras	6	9	8	8	9	1,0	4	6	9	6	8	8	8	8
e. Roodzwenkgras met fijne uitlopers	6	9	8	9	9	1,0	4	6	9	6	8	8	8	8
f. Roodzwenkgras met forse uitlopers	5	7	7	9	7	1,2	5	5	8	6	7	7	9	8
g. Hardzwenkgras	4	7	7	9	6	0,9	3	5	8	8	7	8	8	6
h. Gewoon schapegras	4	7	6	9	6	0,3	2	5	8	8	7	9	7	7
i. Gewoon struisgras	4	8	7	8	10	0,07	2	5	10	8	9	8	9	6
j. Wit struisgras	4	7	6	7	10	0,06	2	4	10	8	10	8	9	5

See page 29 for the translation of terms



### Engels raaigras diploïd (*Lolium perenne*)

Engels raaigras heeft een vlotte aanslag en opkomst en is goed bestand tegen betreding. Het is een vrij snelgroeiende soort en vormt een dichte zode. Deze eigenschappen maken Engels raaigras geschikt voor toepassing in sportvelden, speelgazons en recreatieterreinen. Regelmatig en niet te kort maaien wordt goed verdragen. Onder natte omstandigheden kan Engels raaigras zich vaak moeilijk handhaven. Dit komt door de concurrentie van straatgras en ruwbeemdgras en door meer kans op vorstschade en het optreden van voetrot. Het vraagt voor een mooie dichte zode een geregelde stikstofbemesting en behoudt dan tijdens droogte veelal lang een groene kleur. De rassen van het Engels raaigras die voor sportvelden worden aanbevolen, zijn goed bestand tegen bespeling en zijn wintervast. Het optreden van ziekten kan de zodedichtheid nadelig beïnvloeden. Door het beperken van de stikstofbemesting zal er meer kroonroest en rooddraad optreden. Voetrot zal in dit geval minder voorkomen. Rooddraad geeft op sportvelden doorgaans weinig problemen.

### Engels raaigras tetaploïd (*Lolium perenne*)

Engels raaigras tetaploïd is een nieuw type rassen binnen de soort Engels raaigras. Net als diploïde rassen is dit type ook geschikt voor gebruik op sportvelden, gazons en in het openbaar groen. Engels raaigras tetaploïde rassen zijn snelgroeiend, vlot kiemend, kunnen tegen betreden en laten een snel herstel zien na beschadiging. Rassen van dit type hebben ook een goede ziekteresistentie. Net als de bij de diploïde rassen is een geregelde stikstofbemesting nodig.

### Veldbeemdgras (*Poa pratensis*)

Veldbeemdgras vormt ondergrondse uitlopers en is droogtetolerant en goed wintervast. Ook wordt bespeling en frequent en niet te kort maaien meestal goed verdragen. Veldbeemdgras kan vrij vatbaar zijn voor bladvlekkenziekte. Bij vatbare rassen kan door aantasting het aandeel veldbeemdgras in het grasbestand teruglopen, vooral bij bespeling. Veldbeemdgras wordt gebruikt voor de inzaai van sportvelden, speelgazons, recreatieterreinen en boomgaarden. Voor sportvelden zijn in de eerste plaats de bespelingstolerantie en de standvastigheid van belang. Verder is een goede resistentie tegen bladvlekkenziekte gewenst. Voor speelgazons zijn standvastigheid, een groene winterkleur en fijnheid van blad belangrijk. De opkomst en de eerste ontwikkeling van veldbeemdgras zijn zeer traag. Het kan daarom in het begin moeilijk concurreren met ongewenste grassen als straatgras en onkruiden.

### Roodzwenkgras (*Festuca rubra*)

Het rassenassortiment van roodzwenkgras is ingedeeld in drie groepen: gewoon roodzwenkgras, roodzwenkgras met fijne uitlopers en roodzwenkgras met forse uitlopers. Roodzwenkgras groeit zeer goed op kleigrond en kan bij een matige stikstofvoorziening struisgras in een mengsel verdringen. Ook op een droge, arme zandgrond kan roodzwenkgras overheersen. Verdraagt schaduw vrij goed. Bij droogte loopt de kleur terug, maar het herstel is meestal vlot. Bij langdurige droogte kan aantasting door voetrot ontstaan. De rassen zijn in verschillende mate vatbaar voor rooddraad en voetrot.

De rassen van gewoon roodzwenkgras en roodzwenkgras met fijne uitlopers zijn zeer geschikt voor toepassing in siergazons en op golfgreens. Roodzwenkgras met forse uitlopers is zeer geschikt voor de inzaai van extensief beheerde grasvelden zoals bermen.

### Hardzwenkgras (*Festuca ovina*, subsp. *duriuscula* of *trachyphylla*)

Hardzwenkgras is een droogtetolerante soort. Door veredeling zijn rassen ontstaan die zeer geschikt zijn voor bermen en vooral op drogere grond ook voor gazons in aanmerking kunnen komen. De rassen van hardzwenkgras kunnen goed concurreren onder droge omstandigheden bij een matige stikstofvoorziening. Op goed vochthoudende grond met een goede stikstofbemesting is het concurrentievermogen slechts matig. De rassen zijn over het algemeen vrij weinig vatbaar voor rooddraad.

### Gewoon schapegras (*Festuca ovina*)

Gewoon schapegras is een zeer droogtetolerante soort. De soort is geschikt voor extensieve groeiomstandigheden. Door selectie zijn rassen ontstaan die ook in aanmerking komen voor het gebruik in gazons en extensief beheerde grasvelden. Gewoon schapegras is zeer fijnbladig en groeit traag.

### Gewoon struisgras (*Agrostis capillaris*, syn. *Agrostis tenuis*)

Gewoon struisgras vormt zowel bovengrondse als ondergrondse uitlopers. De rassen zijn uitstekend geschikt voor de aanleg van siergazons, omdat ze kort maaien zeer goed verdragen, een zeer dichte zode vormen en een groot herstellingsvermogen hebben. Struisgras is geschikt voor golfgreens. Bij een goede stikstofvoorziening zal gewoon struisgras andere soorten in een mengsel verdringen. Gewoon struisgras is gevoelig voor winterbetreding. De rassen zijn in verschillende mate vatbaar voor voetrot.

### Wit struisgras (*Agrostis stolonifera*)

Wit struisgras vormt lange bovengrondse uitlopers (stolonen), waardoor een dichte, soms wat viltige zode kan ontstaan. De soort kan onder gazonomstandigheden droogte goed verdragen. In Nederland wordt de soort vrijwel uitsluitend in golfgreens gebruikt. Wit struisgras kan vrij gevoelig zijn voor voetrot.

## 3. Grasmengsels

### 3.1 | Oranjabandmengsels®



Vanaf het jaar 2000 wordt het merk Oranjabandmengsel® op een aantal graszaadmengsels toegepast. Deze kwaliteitsaanduiding is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse kwekers/vertegenwoordigers van graszaden en is van toepassing op graszaadmengsels voor de toepassingen sport, gazon, recreatie, berm en dijk en golfgreens.

Graszaadmengsels met het merk Oranjabandmengsel® zijn uitsluitend samengesteld uit rassen die opgenomen zijn in de Grasnids. Deze rassen dienen bovendien voor hetzelfde toepassingsgebied als waarvoor het mengsel wordt samengesteld, in de Grasnids te zijn opgenomen. Graszaadmengsels die de kwaliteitsaanduiding Oranjabandmengsel® dragen zijn herkenbaar aan het beeldmerk van Oranjabandmengsel® op de verpakking.

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) controleert de samenstelling van het mengsel en de rassen in het mengsel. Is aan de kwaliteitseisen voldaan dan wordt op het NAK-label het toepassingsgebied en Oranjabandmengsel® vermeld. Bijvoorbeeld het Grasnidsmengsel SV 7 bestaat voor 75% uit Engels raaigras (alleen diploïde rassen, Sport) en 25% Veldbeemdgras (Sport). De rassen die in dit mengsel worden gebruikt moeten zijn toegelaten op het toepassingsgebied 'grasrassen voor sport'. Indien aan deze voorwaarde is voldaan mag dit mengsel SV 7 worden genoemd en het merk Oranjabandmengsel® dragen.

Het voordeel voor de consument is dat men zekerheid heeft omtrent de samenstelling en kwaliteit van de graszaadmengsels. De rassen zijn onderzocht en de kwaliteit van het graszaad voldoet aan de allerhoogste normen. Door gebruik te maken van het merk Oranjabandmengsel® wordt de kwaliteit gewaarborgd.

### 3.2 | Toepassing en samenstelling

Grasvelden worden aangelegd voor verschillende toepassingsgebieden, op zeer uiteenlopende grondsoorten en onder diverse omstandigheden. Ook de behandeling en bemesting van grasvelden zijn zeer verschillend, terwijl er ook binnen een grasveld grote verschillen kunnen bestaan in bijvoorbeeld het gebruik en de beschaduwing. Het is daarom gewenst niet één soort te gebruiken, maar een mengsel van enkele soorten. Een mengsel geeft een grotere kans op een goed grasveld door een groter aanpassingsvermogen en minder schade als gevolg van ziekten. Voor de te onderscheiden toepassingsgebieden zijn verschillende mengsels ontwikkeld, aangepast aan de groei- en gebruiksomstandigheden. In het navolgende staan per toepassingsgebied de standaardmengsels weergegeven. Dit zijn de SV-, R-, B-, en D-mengsels. Een mengsel krijgt de aanduiding Grasnidsmengsel als de soortensamenstelling van het mengsel overeen komt met het betreffende standaardmengsel en het daarnaast rassen bevat die zijn opgenomen in de Grasnids. De vermelding van het ras dient voor te komen in de Grasnids, zoals dat achter de soortnaam in het mengseloverzicht is vermeld.

### 3.3 | Sport

Met sportvelden worden terreinen bedoeld die bestemd zijn voor veldsporten, zoals voetbal, hockey en korfbal. Op deze velden wordt meestal ook in de winter veelvuldig gespeeld. Voor sportvelden is een stevige zode en een vlak speelveld gewenst. Grassoorten die een dichte zode vormen, intensief bespelen verdragen en tevens goed wintervast en standvastig zijn, moeten een voorname plaats in de mengsels innemen.

Tabel 3.3.1 Mengsels voor Sport

Mengselaanduiding	SV 7	SV 8	SV 100 <sup>1)</sup>
Geschiktheid voor:			
Winterbespeling	Zeer Goed	Zeer Goed	Zeer Goed
Zomerbespeling	Zeer Goed	Zeer Goed	Zeer Goed
Samenstelling:			
Engels raaigras diploïde rassen (Sport)	75 %	50 %	100 % <sup>1)</sup>
Veldbeemdgras (Sport)	25 %	50 %	
Zaaizaadhoeveelheid bij inzaai kg/veld	200- 250	200- 250	225- 275
Zaaizaadhoeveelheid bij doorzaai in kg/veld	100- 125	100- 125	125- 150

1) Minimaal 2 rassen

#### Zaaizaadhoeveelheid afhankelijk van lengte rustperiode, groeiomstandigheden en bespelingsdruk

In een aantal proeven heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving de invloed van verschillende hoeveelheden zaaizaad op de bespeelbaarheid van sportvelden getoetst. De proefperiode bedroeg een vol speelseizoen. Het gebruik van meer zaaizaad (meer dan 200 kg/ha) gaf een eerder bespeelbaar veld met een dichtere zode. Onkruiden kregen minder kans om zich te vestigen. De voorsprong in zodedichtheid en bezetting van hogere zaaizaadhoeveelheden verdween wel na een aantal maanden van bespeling. Ook proeven van het bekende Engels onderzoeksinstituut STRI te Bingley hebben dit aangetoond.

Bij aanleg onder gunstige groeiomstandigheden en/of een relatief lange rustperiode was in het PPO onderzoek het gebruik van een zaaizaadhoeveelheid van minder dan 200 kg/ha voldoende voor een goed bespeelbaar grasmat gedurende het speelseizoen. Bij aanleg onder minder gunstige groeiomstandigheden en/of een relatief korte rustperiode had het gebruik van meer zaaizaad (meer dan 200 kg/ha) een gunstig effect op de bezetting en de bespelingstolerantie. Op velden met een lage bespelingsdruk heeft naar verwachting het gebruik van meer zaaizaad een positievere invloed op de kwaliteit van de grasmat dan op velden met een hoge bespelingsdruk. Deze resultaten komen overeen met de ervaringen van fieldmanagers uit de Premier League. Hier gaat men wel tot 350 à 400 kg graszaad per veld.

### Stem mengsel af op gebruiksdoel

Als in het voorjaar wordt ingezaaid en het veld binnen drie maanden al in gebruik wordt genomen, hebben mengsels met een hoog aandeel Engels raaigras de voorkeur vanwege de snelle opkomst en vestiging van deze soort. De nazomer is vaak de beste tijd voor inzaai van mengsels met een hoog aandeel veldbeemdgras (SV 8), omdat de temperatuur dan nog voldoende hoog is en de vochtvoorziening minder snel een probleem vormt. Het zich traag vestigende veldbeemdgras krijgt dan de beste kans om zich te vestigen. Een behoorlijk aandeel veldbeemdgras in het bestand geeft een dichte en vlakke grasmat. Het doorzaaien van de kaalgespeelde en open gedeelten is op de meeste sportvelden elk voorjaar een van de belangrijkste onderhoudsmaatregelen om bij aanvang van het volgende speelseizoen weer over een goed bespeelbare grasmat te kunnen beschikken. Hiervoor komen de mengsels SV 7 of SV 100 het meest in aanmerking.

### 3.4 | Gazon

Voor gazons wordt een onderscheid gemaakt in mengsels voor speel- en siergazons. Voor een gazonmengsel zijn van belang: bespelingstolerantie, de standvastigheid, zodedichtheid, het groen blijven zowel in de zomer als in de winter, de resistentie tegen ziekten en de fijnheid van blad. Mengsels voor speelgazons worden gebruikt daar waar het gras sterk moet zijn vanwege intensief gebruik. Bij siergazons is het sierlijk uiterlijk van het gazon belangrijker. Siergazon mengsels worden gezaaid daar waar het gazon extensief gebruikt wordt.

#### Speelgazon

Graszaadmengsels voor speelgazons zijn hoofdzakelijk samengesteld uit de grassoorten Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. De gewenste verhoudingen van de grassoorten in de verschillende speelgazon mengsels hangen onder meer af van de heersende omstandigheden zoals vochtvoorziening en bemestingsniveau en de gewenste snelheid van vestigen. Voor het doorzaaien van een speelgazon met open plaatsen heeft een mengsel met een groot aandeel Engels raaigras de voorkeur vanwege de snelle vestiging en het goede concurrentievermogen. Voor een goede groei van Engels raaigras is een geregelde stikstofbemesting noodzakelijk.

#### Siergazon

In tegenstelling tot speelgazons bevatten siergazons geen Engels raaigras. Graszaadmengsels voor siergazons zijn hoofdzakelijk samengesteld uit de grassoorten roodzwenkgras, veldbeemdgras, hardzwenkgras en struisgras.

Siergazons vormen een fijne en dichte zode. Siergazons verdragen enige zomerbetreding vrij goed, maar winterbetreding matig. Zowel struisgras als roodzwenkgras met uitlopers kunnen opengevallen plaatsen weer opvullen. Op zandgrond met een goede vochten stikstofvoorziening zal in siergazons het struisgras gaan overheersen. Op arme, droge zandgrond met weinig of geen stikstofbemesting of onder bomen komt na inzaai van dit mengsel het roodzwenkgras sterker naar voren.

Voor traaggroeiende gazons wordt een mengsel met gewoon schapegras aangeraden. Voor een schaduwgazon wordt geadviseerd wat hoger te maaien. De inzaaiperiode van gazonmengsels is vanaf eind maart tot en met begin september.

Bij een optimaal bemestingsniveau, een goed maairegime en een goede vochtvoorziening blijft het gazon evenwichtig van samenstelling en garandeert het vele jaren plezier. Bij suboptimaal of verwaarloosd onderhoud zal de ene of de andere grassoort gaan overheersen, met een teruglopende gazonkwaliteit als gevolg.

### 3.5 | Recreatie

Met recreatieterreinen worden grasvelden op kampeerterreinen en dagcampings bedoeld. Naast de recreatieterreinen zijn er grasvelden waarvan de sierwaarde van ondergeschikt belang is. Dit kunnen bijvoorbeeld speelweiden, trapveldjes of zonneweiden zijn. Het meest kenmerkende van deze terreinen is dat zij hoofdzakelijk in de zomer gebruikt worden.

In de herfst en winter kan herstel van de door het gebruik veroorzaakte schade optreden. Tegen een langdurige bedekking, door bijvoorbeeld tenten, is geen enkele grassoort bestand. Soorten met ondergrondse uitlopers zoals roodzwenkgras met fijne of forse uitlopers en veldbeemdgras kunnen echter na enkele weken bedekking toch weer spruiten vormen uit de niet afgestorven uitlopers.

Tabel 3.5.1 Mengsel voor Recreatie

Mengselaanduiding	R 1
Samenstelling:	
Engels raaigras diploïde rassen (Sport of Gazon)	20 %
Veldbeemdgras (Sport of Gazon)	25 %
Gewoon roodzwenkgras (Gazon)	15 %
Roodzwenkgras met fijne of forse uitlopers (Gazon)	20 %
Hardzwenkgras of schapegras (Gazon)	20 %
Zaaihoeveelheid in kg/ha	200- 250

Op grasvelden waarvan het gebruik, de bodemgesteldheid, de vochtvoorziening of het onderhoud kunnen variëren of onvoldoende bekend zijn, kan men het veelzijdige mengsel R 1 inzaaien.

Dit mengsel heeft door het aandeel Engels raaigras een vrij vlotte aanslag. Bij veel betreden en geregeld maaien op 3 - 5 cm zullen bij goede groeiomstandigheden Engels raaigras en veldbeemdgras meer naar voren komen. De laatste vooral onder drogere omstandigheden. Bij weinig of niet betreden zal afhankelijk van de grondsoort en de bemesting gewoon struisgras of roodzwenkgras gaan domineren. Op arme of droge grond zullen hardzwenkgras en schapegras meer kans krijgen. Weinig maaien wordt het beste verdragen door roodzwenkgras en veldbeemdgras.



### 3.6 | Berm

Bij de samenstelling van een mengsel voor bermen moet rekening gehouden worden met de volgende eisen: de ingezaaide grassen dienen zich betrekkelijk snel te vestigen, goed standvastig te zijn, een sterke zode te vormen en snel opengevallen plaatsen weer te vullen. Belangrijk is dat het mengsel traag groeit om de hoeveelheid maaisel te beperken.

Tabel 3.6.1 Mengsel voor Berm

Mengselaanduiding	B 3
Samenstelling:	
Roodzwenkgras met fijne of forse uitlopers (Gazon)	30 %
Gewoon roodzwenkgras (Gazon)	20 %
Schapegras of hardzwenkgras (Gazon)	45 %
Gewoon struisgras (Gazon) <sup>1)</sup>	5 %
Zaaizaadhoeveelheid in kg/ha	100- 125

1) Het aandeel gewoon struisgras mag in het B 3-mengsel vervangen worden door Highland Bent.

### 3.7 | Dijk

Voor zeedijken is een dichte, goed wintervaste grasmat gewenst voor bescherming tegen overslaand water en zware regenval. Goede zodevormers moeten daarom een belangrijke plaats in het bestand innemen. Omdat de vochtvoorziening op dijken niet altijd optimaal is, zijn droogtetolerante soorten als roodzwenkgras en veldbeemdgras in de mengsels opgenomen.

Tabel 3.7.1 Mengsels voor Dijk

Mengselaanduiding	D 1	D 2
Samenstelling:		
Engels raaigras (laat doorschietend) (Rassenlijst 2022) <sup>1)</sup>	40 %	
Engels raaigras diploïde rassen (Sport of Gazon)		10 %
Veldbeemdgras (Sport of Gazon)	25 %	30 %
Roodzwenkgras met fijne uitlopers (Gazon)	15 %	30 %
Roodzwenkgras met forse uitlopers (Gazon)	10 %	30 %
Witte cultuurklaver (Rassenlijst 2022)*	10 %	
Zaaizaadhoeveelheid in kg/ha	100- 125	100- 125

1) De rassen dienen vermeld te zijn in de Aanbevelende Rassenlijst 2022

Het mengsel D 1 is bestemd voor dijken die beweid of gehooid worden. Het bevat vrij veel Engels raaigras (laat doorschietend) en ook witte cultuurklaver. Deze soorten die voor landbouwdoeleinden (voedergewassen) worden toegepast, staan niet in de Grasnids beschreven. Hiervoor wordt verwezen naar de Aanbevelende Rassenlijst 2021.

Het mengsel D 2 is bestemd voor zogenaamde maaidijken die een aantal keren per jaar tamelijk kort gemaaid worden en weinig bemesting krijgen. Het mengsel bevat een laag percentage Engels raaigras, deze soort is bedoeld om een snelle opkomst en grondbedekking te krijgen. Door de geringe bemesting zal het aandeel Engels raaigras spoedig verdrongen worden door andere roodzwenkgras.

### 3.8 | Golfgreen

Voor de green is een zeer vlakke en dichte grasmat een vereiste en moet de mat bijna dagelijks maaien op 4 -6 mm kunnen verdragen. De grassoorten roodzwenkgras (gewoon en met fijne uitlopers) en struisgras (gewoon) die beschreven zijn in hoofdstuk 4.4 komen hiervoor in aanmerking. Om het zwakke en niet gewenste straatgras of *Poa annua* in de green te weren, is een lagere pH (zuurgraad), droogte en een goede beluchting van belang.

Naast de golfgreen komen we op de golfbanen nog andere grasoppervlakten tegen zoals tee, fairway, rough en driving range. Voor deze grasoppervlakten staan geen aanbevolen grasrassen vermeld in de Grasnids.

Op de tee die het meest te lijden heeft door het gebruik, wordt hoofdzakelijk een mengsel gebruikt van veldbeemd- en roodzwenkgras (gewoon en met fijne uitlopers). Vanwege de snelle opkomst en prima bespelings tolerantie wordt (in toenemende mate) ook gebruik gemaakt van fijnbladige rassen Engels raaigras. De aanbevolen maaihoogte is 1,5 - 2 cm.

De fairway beslaat het grootste deel van het speeloppervlak. Een mengsel van veldbeemd-, roodzwenk- (gewoon en met fijne uitlopers), hardzwenk- en gewoon struisgras volstaat. Voor een extensief onderhoudsregime wordt het veldbeemdgras uit het mengsel gelaten. De ideale maaihoogte ligt op 2 tot 2,5 cm.

De rough vormt de overgang tussen het functionele gras en de natuurlijke omgeving. Aangezien de rough slechts één- tot tweemaal per jaar wordt gemaaid, is het gebruik van extensief te beheren grassoorten aan te bevelen. Een mengsel van roodzwenk-, (gewoon en met fijne en forse uitlopers), hardzwenk- en/of schapegras (gewoon en fijnbladig) volstaat.

De driving range wordt het hele jaar rond gebruikt. Door het machinaal verzamelen van de golfballen worden hoge eisen gesteld aan de berijdbaarheid van de grasmat. Hiervoor komt een mengsel van Engels raai- en veldbeemdgras in aanmerking.

## 4. Grasrassen

### 4.1 | Toepassing en beoordeling

Grasrassen worden onderscheiden naar de toepassingsgebieden Sport en Gazon.

In de Grasgidstabellen zijn de grasrassen per soort vermeld die worden aanbevolen voor het gespecificeerde toepassingsgebied. Apart staan de nieuwe rassen vermeld die volgend jaar in de lijst van Grasgidsrassen zullen worden opgenomen.

De grasrassen zijn beoordeeld op de eigenschappen die voor de toepassing relevant zijn. In de tabellen staan deze eigenschappen weergegeven in volgorde van belangrijkheid. De rassen worden voor de eigenschappen beoordeeld met een waarderingscijfer van 1 t/m 10, waarbij een hoger cijfer een hogere waardering voor de betreffende eigenschap inhoudt. Opgemerkt dient te worden dat alleen binnen een soort de beoordelingen voor een eigenschap vergelijkbaar zijn.

In het volgende overzicht is een beschrijving gegeven van de eigenschappen die in de tabellen vermeld staan (afhankelijk van de soort en toepassing):

#### Bespelingstolerantie (Wear tolerance)

De bespelingstolerantie is de gemiddelde bezetting van het ras onder invloed van bespeling. Een hoge waardering voor deze eigenschap geeft een goede tolerantie van het ras tegen bespeling aan.

#### Zodedichtheid (Density)

De zodedichtheid is de bezetting van een ras onder gunstige groeiomstandigheden.

#### Standvastigheid (Persistency)

De standvastigheid is de mate waarin een ras zijn aanvankelijke zodedichtheid weet te behouden. Een ras met een hoge waardering voor standvastigheid behoudt zijn zodedichtheid onder invloed van het beheer en het gebruik en laat ongewenste soorten niet toe.

#### Herstellingsvermogen (Recovering ability)

Het herstellingsvermogen is de mate van herstel van de zodedichtheid. Een hoge waardering van het herstellingsvermogen duidt op een vlot herstel van de zodedichtheid na een bespelingperiode.

#### Droogtetolerantie (Drought tolerance)

De droogtetolerantie is de mate waarin een ras zijn zodedichtheid weet te behouden na en tijdens een droogteperiode. Rassen zijn in verschillende mate gevoelig voor vochttekorten. Een hoge waardering duidt op een goede weerstand tegen een droge periode.

#### Ziekteresistentie (Disease tolerance)

De ziekteresistentie is de weerstand tegen het optreden van ziekten en de effecten van optredende ziekten. Een hoog cijfer betekent een grote weerstand tegen de betreffende ziekte.

#### Fijnheid van blad (Fineness of leaf)

De fijnheid van blad is gekarakteriseerd van zeer grof tot zeer fijn. In de tabellen wordt dit uitgedrukt door de cijfers van 2 t/m 10 waarbij 2 = zeer grof en 10 = zeer fijn.

#### Bladkleur (Genetic colour)

Dit is de kleur die waargenomen wordt gedurende het groeiseizoen onder goede groeiomstandigheden. Dit wordt uitgedrukt in: zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd).

#### Verkleuring (Discolouration)

Ten aanzien van de kleur is van belang het optreden van verkleuring. De verkleuring wordt waargenomen van groen naar geel dan wel bruin. De verkleuring wordt in een waardeschaal uitgedrukt: zeer ernstig = 2; ernstig = 4; matig = 6; gering = 8; geen = 10.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verkleuring in de winter en de verkleuring bij droogte.

#### Traagheid van groei (Short growth)

De traagheid van groei wordt vastgesteld uit de lengteontwikkeling van de totale bladmassa. Hoe hoger de waardering, des te minder de gebruiker hoeft te maaien.

#### Maaibeeld (Cleanness of cutting)

Het cijfer voor maaibeeld geeft weer hoe mooi het gras afmaait. Rassen van Engels raaigras met een lager cijfer voor maaibeeld kunnen na het maaien rafelig blad vertonen. Naast de raskeuze draagt ook een goed afgestelde maaier bij aan een mooier maaibeeld.

### 4.2 | Ziekten

In het volgende overzicht is een korte beschrijving gegeven van de ziekten die in de tabellen genoemd worden. De verschillende grassoorten zijn in sterk verschillende mate vatbaar voor de te onderscheiden ziekten. In de beoordelingstabellen staan alleen de ziekten vermeld waar de soort vatbaar voor is.

#### Meeldauw (Erysiphe graminis)

Schimmelziekte. De bladeren zijn in meer of mindere mate bedekt met wit schimmelpluis, dit wordt later grijs van kleur. In dit schimmelpluis bevinden zich zwarte puntjes. De aangetaste bladeren sterven af. Meeldauw treedt vooral op bij hoge luchtvochtigheid.



**Bladvlekkenziekte (*Drechslera poae*)**

De ziekte kenmerkt zich door het verschijnen van kleine, waterige bruine vlekken op de bladeren die kunnen uitgroeien tot grotere vlekken of tot netvlekken. Eveneens treedt een vergeling van de bladpunten op. De ziekte manifesteert zich vooral in de herfst en het voorjaar, wanneer de groeiomstandigheden voor het gras niet optimaal zijn. Ook kan aantasting aan de bladschede of wortelhals optreden waardoor planten kunnen wegvallen.

**Voetrot (*Gerlachia nivalis*; *Fusarium spp.*)**

Deze schimmel komt geregeld in Nederland voor en kan bij ernstige aantasting grote schade doen ontstaan. De eerste symptomen bestaan vaak uit kleine plekken die nat en geelbruin tot donkerbruin gekleurd zijn, deze kunnen zich snel uitbreiden. Aan de randen kan een zone met wit schimmel te zien zijn. De schimmel kan zich onder sneeuw uitbreiden, waarbij de schade pas zichtbaar wordt als de sneeuw verdwenen is. Hoewel de schimmel zich meestal manifesteert van herfst tot voorjaar, kan ook in de rest van het jaar aantasting optreden, bijvoorbeeld tijdens een natte, warme zomer.

**Bruine-vlekkenroest (*Puccinia brachypodii*)**

Manifesteert zich vooral bij veldbeemdgras. De aantasting kan vanaf april verspreid in het gewas optreden. Op de bladeren worden bruine, ronde sporenhoopjes gevormd. Bij ernstige aantasting zijn ook de bladschede, stengel en pluim aangetast.

**Oranje-strepenroest (*Puccinia poarum*)**

Deze ziekte komt eveneens voornamelijk voor bij veldbeemdgras. De aantasting komt plekgewijs voor (mei/juni). Op de bladeren ontstaan strepen van oranje-rode sporenhoopjes. De schimmel kan ook de bladschede, stengel en pluim aantasten.

**Kroonroest (*Puccinia coronata*)**

Aantasting door kroonroest treedt meestal pas vanaf eind juni op tot in de herfst. Verspreid over het blad liggen oranje sporenhoopjes. De stengel en de bloeiwijze worden niet aangetast. Kroonroest komt voornamelijk voor bij Engels raaigras.

**Rooddraad (*Laetisaria fuciformis*)**

Het meest opvallende kenmerk van de schimmelziekte rooddraad is de aanwezigheid van roze tot roodgekleurde draden aan de bladhalmen van aangetaste bladhalmen. De aantasting treedt vooral op in zomer en herfst. Vooral roodzwenkgras kan door deze schimmelziekte worden aangetast.

## 4.3 | Grasrassen voor Sport

Tabel 4.3.1 Engels raigras diploïde rassen (Sport)

Rasnaam	Bespe- lings- tolerantie	Herstel- lings- vermogen	Stand- vastigheid	Resistentie tegen			
				Voetrot in de winter	Rood- draad	Kroon- roest	Bladvlek- kenziekte
Saila	8,3	8,2	8,4	-	7,5	8,1	8,2
Barbasten	8,2	8,4	8,3	7,4	6,9	8,0	8,4
Eurobeat	8,1	8,3	8,2	7,6	7,5	8,2	8,3
Lionel	8,1	8,3	8,2	-	7,3	7,8	8,3
Barmarga	7,9	8,5	8,3	7,7	7,6	7,7	8,5
Eurosport	8,0	8,2	8,2	7,4	7,2	7,6	8,4
Eurodiamond	7,9	8,5	8,3	7,8	7,1	7,1	8,5
Martinella	7,9	8,3	8,3	7,5	7,5	7,9	8,1
Barobben	7,9	8,3	8,3	8,0	7,3	8,2	8,4
Baradona	8,0	8,1	7,9	8,3	6,5	7,4	7,8
Columbine	7,7	8,3	8,2	7,6	7,3	7,8	8,3
Berlioz 1	7,6	8,3	8,3	7,5	7,4	7,6	8,3
Bareuro	7,6	8,4	8,2	7,6	7,2	7,4	6,9
Vesuvius	7,7	8,2	8,0	7,8	7,3	7,0	7,1
Baromario	7,5	8,4	8,0	7,5	6,8	7,8	8,3
Bizet 1	7,6	8,4	8,3	8,0	7,4	7,0	8,4
Calico	7,8	8,2	7,9	7,6	6,8	8,5	8,2
Bargita	7,6	8,4	8,0	7,4	7,3	6,1	7,8
Barlicum	7,6	8,3	8,1	7,2	7,2	8,4	8,4
Venice	7,5	8,3	8,1	7,7	7,6	7,9	7,8
Eurocordus	7,5	8,2	8,0	7,8	7,3	6,7	8,1
Nieuw							
Lamar	8,2	8,3	8,1	6,8	7,1	8,2	7,8
Bargkamp	8,1	8,3	8,1	8,2	7,5	7,7	8,1
Barabins	7,9	8,2	8,5	7,7	7,2	8,2	8,5

- = niet waargenomen

Tabel 4.3.2 Engels raigras tetraploïde rassen (Sport)

Rasnaam	Bespe- lings- tolerantie	Herstel- lings- vermogen	Stand- vastigheid	Resistentie tegen			
				Voetrot in de winter	Rood- draad	Kroon- roest	Bladvlek- kenziekte
Fabian	7,5	8,2	8,1	8,5	8,1	8,4	8,5
Tetramagic	7,2	8,3	8,3	-	8,0	8,4	8,4
Tetragon	7,1	8,2	8,1	-	8,1	7,8	8,4
Double	6,2	8,1	7,8	-	8,4	8,2	8,0
Tetrasport	5,8	8,0	7,4	-	8,2	8,1	7,9
Nieuw							
Tetragame	7,7	8,2	7,8	8,5	7,9	8,0	8,5
Barquad	7,0	8,2	8,1	8,2	8,1	7,3	8,5

- = niet waargenomen

Tabel 4.3.3 Veldbeemdgras (Sport)

Rasnaam	Bespe- lings- tolerantie	Herstel- lings- vermogen	Stand- vastigheid	Resistentie tegen			
				Bladvlek- kenziekte	Oranje strepen- roest	Bruine vlekken- roest	Rooddraad
Barclaren	8,5	8,5	8,2	8,3	8,3	8,5	8,5
Barghini	8,1	8,3	8,0	8,1	8,3	8,3	8,1
Xiamara	8,1	8,1	7,8	7,6	8,2	8,3	7,2
Greenplay	7,7	8,3	8,1	7,4	6,5	6,5	7,5
Joker	7,8	8,3	7,9	7,3	7,5	7,1	6,9
Yvette	7,8	8,2	7,7	7,7	8,1	8,3	7,5
Bariris	7,6	8,5	8,1	8,0	7,4	7,0	7,3
Dakisha	7,8	8,1	7,6	8,1	8,0	8,4	7,5
Limousine	7,6	8,3	8,0	7,3	6,7	6,4	7,6
Becca	7,6	8,2	7,8	7,2	7,3	7,0	7,2
Baranello	7,3	8,2	7,7	8,1	8,4	7,5	8,1
Barhelene	7,7	8,3	8,2	7,2	6,6	6,4	7,4
Markus	7,8	8,3	7,7	8,5	8,3	8,5	7,4
Miracle	5,0	8,0	6,6	5,6	8,4	7,9	7,5
Nieuw							
Ximena	8,3	8,0	7,8	7,9	8,0	8,2	7,0

## 4.4 | Grasrassen voor gazon

Tabel 4.4.1 Engels raaigras diploïde rassen (Gazon)

Rasnaam	Standvastigheid	Zodichtheid	Resistentie tegen				Fijnheid van blad	Verkleuring		Traagheid van groei	Maaibeeld	Bladkleur *
			Voetrot in de winter	Rooddraad	Kroonroest	Bladvlekkenziekte		In de winter	Bij droogte			
Alathea	8,4	8,4	7,5	7,3	7,8	8,4	8,2	7,7	6,5	8,5	8,4	m
Gwynett	8,5	8,3	7,2	6,9	7,9	8,0	8,3	7,4	6,6	8,4	8,3	l
Barpractise	8,3	8,3	6,5	6,7	8,5	8,3	8,1	7,5	7,7	8,3	8,5	m
Lize	8,2	8,2	-	7,5	7,9	8,5	8,2	8,2	7,0	8,2	8,3	m
Eventus	8,4	8,3	7,6	7,1	7,7	8,3	8,2	7,6	7,1	8,0	8,0	m
Barpersie	8,4	8,2	-	7,5	7,8	7,4	8,2	6,9	6,8	8,2	8,0	zl
Gianna	8,4	8,0	7,4	7,7	8,1	8,4	7,8	7,5	6,8	7,8	8,0	l
Chardin	8,2	8,1	7,1	7,2	8,0	8,2	8,1	7,9	6,7	7,9	8,2	l
Barolympic	8,3	8,3	7,3	6,9	7,3	5,1	8,3	6,4	7,0	8,3	8,5	zl
Clementine	8,3	8,2	6,9	7,1	7,7	5,1	8,0	7,1	7,0	8,2	8,4	l
Cabrio	7,9	8,3	6,9	6,1	8,3	7,0	8,5	7,5	6,9	8,3	7,7	d
Duparc	8,2	8,0	7,5	7,7	8,2	8,1	7,8	7,7	7,0	7,7	7,9	l
Estelle	8,4	8,1	7,2	7,2	6,6	7,7	8,0	7,4	6,3	7,8	7,6	l
Bargold	8,0	8,2	7,6	7,2	6,7	8,2	8,1	7,3	6,6	8,0	8,2	m
Monroe	8,0	8,0	7,9	6,9	7,0	7,7	8,0	7,5	7,1	8,0	8,0	d
Alison	8,1	8,0	7,4	7,4	6,7	7,9	7,9	7,5	6,7	7,6	7,9	m
Lancelot	8,4	8,3	-	6,8	8,5	6,8	8,4	7,1	6,8	8,3	8,5	l
Dylan	8,1	7,9	7,5	7,5	8,2	8,3	7,8	7,9	7,2	7,9	8,0	m
Vesuvius	8,3	7,9	7,8	7,3	6,7	7,1	7,6	7,3	7,0	7,6	8,0	m
Eurocordus	8,3	7,9	7,8	7,3	6,5	8,1	7,6	7,2	7,3	7,5	7,6	m
Altesse	7,8	7,9	7,6	7,7	8,2	8,1	7,7	7,4	6,9	7,3	7,2	d
Nieuw												
Banksy	8,5	8,4	8,1	7,4	8,3	7,7	8,1	7,6	6,9	8,4	8,3	m
Minnelli	8,2	8,5	7,0	7,2	8,1	8,4	8,5	7,4	7,5	8,3	8,5	l
Totoro	8,5	8,4	6,0	7,4	8,2	6,9	8,4	7,2	6,5	8,4	8,3	m
Elva	8,3	8,2	7,8	7,0	8,3	8,0	8,1	7,6	7,2	8,1	8,3	m

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)

- = niet waargenomen

Tabel 4.4.2 Engels raaigras tetraploïde rassen (Gazon)

Rasnaam	Standvastigheid	Zodichtheid	Resistentie tegen				Fijnheid van blad	Verkleuring		Traagheid van groei	Maaibeeld	Bladkleur *
			Voetrot in de winter	Rooddraad	Kroonroest	bladvlekkenziekte		In de winter	Bij droogte			
Fabian	8,3	7,4	8,5	8,1	8,1	8,5	7,0	7,9	7,8	7,2	7,4	d
Tetramagic	8,1	7,0	-	8,0	8,2	8,4	6,6	7,6	8,2	6,6	6,8	d
Tetragon	8,0	7,0	-	8,1	7,5	8,4	6,5	7,9	8,0	6,2	6,4	d
Tetrasport	7,4	6,8	-	8,2	7,8	7,9	6,4	7,7	7,8	6,0	7,0	zd
Double	7,4	6,8	-	8,4	7,9	8,0	6,0	7,9	7,8	5,9	6,8	zd
Nieuw												
Tetragame	8,1	7,5	8,5	7,9	7,7	8,5	7,0	7,6	7,6	7,4	8,0	zd
Barquad	7,6	6,9	8,2	8,1	7,1	8,5	6,4	7,2	7,4	6,7	7,3	zd

- = niet waargenomen

Tabel 4.4.3 Veldbeemgras (Gazon)

Rasnaam	Standvastigheid	Zodichtheid	Resistentie tegen				Winterkleur	Fijnheid van blad	Bladkleur*
			blad-vlekkenziekte	Oranje strepenroest	Bruine vlekkenroest	Rooddraad			
Bethani	7,9	8,5	7,9	7,9	7,7	7,6	7,0	7,8	m
Joker	8,1	8,4	7,3	7,5	7,0	6,9	7,0	7,7	m
Becca	7,8	8,4	7,2	7,3	6,9	7,2	7,3	7,8	m
Borsala	8,1	8,1	8,1	8,5	8,4	6,9	6,3	7,2	m
Abalina	8,3	8,2	7,4	8,4	8,5	7,1	5,9	6,8	m
Markus	8,5	7,9	8,5	8,2	8,4	7,4	5,9	6,4	m
Isadora	8,3	8,1	7,9	8,4	8,5	6,9	5,8	6,8	l
Yvette	8,3	8,1	7,7	8,1	8,2	7,5	5,8	6,8	m
Limousine	7,7	8,2	7,3	6,7	6,2	7,6	7,1	7,3	m
Rihanna	7,9	8,3	7,2	7,0	6,7	7,7	7,2	7,3	m
Barhelene	7,7	8,2	7,2	6,6	6,3	7,4	7,2	7,2	m
Barclaren	7,5	7,7	8,3	8,3	8,3	8,5	7,8	5,7	d
Miracle	7,4	7,4	5,6	8,3	7,7	7,5	7,6	5,7	d
Nieuw									
Ximena	8,5	8,2	7,9	8,0	8,0	7,0	5,9	6,9	m
Arya	7,8	8,5	7,1	8,0	6,7	6,4	7,0	7,8	m
Kyenna	8,4	8,1	8,2	8,0	8,1	6,9	6,1	7,0	m
Nino	8,5	7,9	8,4	7,9	8,2	8,4	5,9	6,5	m

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)



Tabel 4.4.3 Gewoon roodzwenkgras (Gazon)

Rasnaam	Standvastigheid	Zodichtheid	Resistentie tegen		Verkleuring		Bladkleur*
			Voetrot in de winter	Rooddraad	In de winter	Bij droogte	
Dancing	8,5	8,1	-	7,2	7,7	6,7	m
Balkan	7,9	8,1	8,5	8,0	8,0	7,3	l
Barpatria	7,9	8,5	8,0	8,5	7,1	6,7	zl
Barlineus	8,1	8,2	8,0	8,0	6,9	7,0	l
Orionette	8,3	7,9	-	7,4	7,6	6,9	zl
Ramona	8,1	8,1	-	8,0	7,3	7,0	l
Camanette	8,3	8,1	-	6,0	7,3	6,8	m
Gima	8,1	8,1	7,7	7,3	7,2	6,7	m
Bogart	8,0	8,0	7,5	7,7	7,1	7,0	l
EuroCarina	8,0	8,0	7,8	7,3	6,9	7,3	m
Filius	8,1	8,0	7,5	7,4	6,7	6,6	m
Barchip	7,9	7,8	7,8	6,9	6,7	7,6	d
Barswing	7,7	7,9	7,6	8,5	7,1	7,1	m
Siskin	7,4	7,5	8,2	8,3	7,7	7,5	d
Greensleeves	7,7	7,7	8,3	7,0	7,5	6,5	m
Bargreen	7,5	7,4	7,6	7,7	7,1	7,0	l
Trophy	7,0	6,8	8,1	7,8	7,4	7,4	m

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)

- = geen waarneming

Tabel 4.4.4 Roodzwenkgras met fijne uitlopers (Gazon)

Rasnaam	Standvastigheid	Zodichtheid	Resistentie tegen		Verkleuring		
			Voetrot in de winter	Rooddraad	In de winter	Bij droogte	Bladkleur*
Seroa	8,2	8,0	6,7	7,4	7,1	7,2	m
Coptic	7,9	8,0	7,3	7,6	7,1	7,4	d
Tasida	8,0	7,9	7,4	7,4	7,3	6,5	d
Maryse	8,0	8,0	7,0	6,7	7,6	6,9	m
Aiglon	7,7	8,0	7,6	7,5	7,5	7,0	m
Absolom	8,1	8,1	6,7	7,7	6,4	6,1	l
Barnoustie	7,8	8,1	7,3	7,9	6,8	6,9	m
Teenie	7,9	7,9	7,0	7,2	6,7	7,0	m
Barcrown	7,5	8,1	6,6	8,5	6,5	7,2	l
Barmalia	7,8	7,9	5,8	7,9	7,7	6,5	l
Beudin	7,6	8,0	7,2	7,4	6,4	7,4	l
Barpearl	7,5	8,0	6,6	8,3	6,4	7,2	m
Finesto	7,9	8,0	7,3	7,1	6,6	7,0	zl
Cezanne	7,5	7,9	7,0	7,3	6,8	6,9	m
Borluna	7,5	7,3	7,6	7,5	7,2	7,3	d
Smirna	7,3	7,3	7,7	7,0	7,1	6,8	m

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)

Tabel 4.4.5 Roodzwenkgras met forse uitlopers (Gazon)

Rasnaam	Standvastigheid	Zodichtheid	Resistentie tegen		Verkleuring		
			Voetrot in de winter	Rooddraad	In de winter	Bij droogte	Bladkleur*
Runa	7,4	7,0	7,8	7,0	7,3	7,2	l
Joshua	7,4	7,0	8,1	6,4	6,9	6,9	zl
Hastings	7,2	7,1	7,3	7,0	6,9	7,1	zl
Laverda	7,3	7,1	6,6	6,8	6,3	7,3	m
Rockefeller	6,7	6,9	7,8	7,2	7,3	7,1	l
Benji	6,9	6,8	7,6	7,1	6,8	7,1	m
Barjessica	6,9	6,6	7,1	7,4	6,9	7,2	m
Heidrun	6,8	6,4	7,4	7,1	6,9	7,0	m
Rossinante	6,6	6,7	7,9	6,9	6,9	7,2	m
Mellori	6,4	6,3	7,7	7,1	6,6	7,3	d
Corail	6,5	6,0	7,3	6,7	6,7	7,0	m

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)

**Tabel 4.4.6 Hardzwenkgras (Gazon)**

Rasnaam	Standvastigheid	Zodedichtheid	Resistentie tegen		Verkleuring		
			Voetrot in de winter	Rooddraad	In de winter	Bij droogte	Bladkleur*
Hardtop	8,5	8,0	6,8	7,6	7,1	6,9	d
Dumas 1	8,3	8,1	6,9	8,2	6,8	7,2	d
Crystal	8,1	8,2	8,4	7,9	7,4	5,7	zd
Mentor	8,2	8,0	6,8	7,9	6,7	7,1	m

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)

**Tabel 4.4.7 Gewoon Schapegras (Gazon)**

Rasnaam	Standvastigheid	Zodedichtheid	Resistentie tegen		Verkleuring		
			Voetrot in de winter	Rooddraad	In de winter	Bij droogte	Bladkleur*
Quatro	8,5	8,5	8,0	8,5	7,9	6,9	zd

\* Zeer lichtgroen (zl), lichtgroen (l), middengroen (m), donkergroen (d) en zeer donkergroen (zd)

**Tabel 4.4.8 Struisgras (Gazon)**

De cijfers van gewoon struisgras voor gazon zijn te vinden in tabel L7 *Bentgrass* op pagina 17 van de publicatie turfgrass seed 2022 van de BSPB [hier](#).

## 5. Kwekers en vertegenwoordigers grasgidsrassen

Tabel 5.1 Overzicht van de Grasgidsrassen voor 2024 van Engels raagrass en veldbeemdrassen en de Nederlandse vertegenwoordigers

	ploëdie	Engels raagrass	sport	gazon	Veldbeemdgras	sport	gazon
Barenbrug Holland BV	di	Altesse		x	Baranello	x	
	di	Barabins	x		Barclaren	x	x
	di	Baradona	x		Barghini	x	
	di	Barbasten	x		Barhelene	x	x
	di	Bareuro	x		Bariris	x	
	di	Bargita	x				
	di	Bargkamp	x				
	di	Bargold			x		
	di	Barlicum	x				
	di	Barmarga	x				
	di	Barobben	x				
	di	Barolympic			x		
	di	Baromario	x				
	di	Barpersie			x		
	di	Barpractice			x		
	tetra	Barquad	x		x		
	DLF BV	di	Alathea		x	Bethani	
di		Berlioz 1	x		Borsala		x
di		Bizet 1	x		Dakisha	x	
di		Chardin			Greenplay	x	
di		Clementine			Kyenna		x
di		Cleopatra	x		Miracle	x	x
di		Columbine	x				
di		Dickens 1			x		
di		Duparc			x		
di		Dylan			x		
di		Estelle			x		
di		Gwynett			x		
di		Lancelot	x				
di		Lize			x		
di		Martinella	x				
di		Monroe			x		
di		Saila	x				
tetra		Fabian	x		x		
tetra		Double	x		x		
tetra	Tetragame	x		x			

Tabel 5.1 Vervolg overzicht van de Grasgidsrassen voor 2024 van Engels raai-gras en veldbeemdrassen en de Nederlandse vertegenwoordigers

	ploëdie	Engels raagrass	sport	gazon	Veldbeemdgras	sport	gazon
DSV zaden Nederland BV	di	Eurobeat	x		Joker	x	x
	di	Eurocordus	x	x	Limousine	x	x
	di	Eurodiamond	x		Markus	x	x
	di	Eurosport	x		Nino		x
	di	Eventus			x		
	di	Lamar	x				
	di	Vesuvius	x		x		
	tetra	Tetragon	x		x		
	tetra	Tetrasport	x		x		
	Limagrain Nederland BV	di	Alison			x	Arya
di		Banksy			x	Becca	x
di		Berlioz 1	x			Greenplay	x
di		Cabrio			x	Miracle	x
di		Calico	x			Rihanna	
di		Clementine			x	Yvette	x
di		Columbine	x			Xiamara	x
di		Gianna			x	Ximena	x
di		Lionel	x				
di		Minnelli			x		
di	Venice	x		x			
tetra	Tetramagic	x		x			



**Tabel 5.2** Overzicht van de Grasgidsrassen voor 2024 van Gewoon roodzwenkgras en Roodzwenkgras met fijne uitlopers en de Nederlandse vertegenwoordigers

	Gewoon roodzwenkgras	gazon	Roodzwenkgras met fijne uitlopers	gazon	Roodzwenkgras met forse uitlopers	gazon
Barenbrug Holland BV	Barchip	x	Barcrown	x	Barjessica	x
	Bargreen	x	Barmalia	x		
	Barlineus	x	Barnoustie	x		
	Barswing	x	Barpearl	x		
	Barpatria	x				
	Dancing	x				
DLF BV	Balkan	x	Absolom	x	Corail	x
	Bogart	x	Aiglon	x	Hastings	x
	Gima	x	Beudin	x	Laverda	x
	Greensleeves	x	Brumana	x	Rossinante	x
	Highnote	x	Cezanne	x	Runa	x
	Orionette	x	Seroa	x		
	Trophy	x	Smirna	x		
			Coptic	x		
DSV zaden Nederland BV	EuroCarina	x	Finesto	x	Mellori	x
	Filius	x	Tasida	x	Rockefeller	x
	Ramona	x	Teenie	x		
Limagrain Nederland BV	Camanette	x	Beudin	x	Benji	x
	Siskin	x	Maryse	x	Corail	x
	Trophy	x			Heidrun	x
			Smirna	x	Joshua	x
Vandinter Semo		Borluna	x			

**Tabel 5.3** Overzicht van de Grasgidsrassen voor 2024 van Hardzwenkgras en Gewoon schapegras en de Nederlandse vertegenwoordigers

	Hardzwenkgras	gazon	Gewoon schapegras	gazon
Barenbrug Holland BV	Hardtop	x		
DLF BV	Dumas 1	x	Quatro	x
DSV zaden Nederland BV	Mentor	x		
Limagrain Nederland BV	Crystal	x		

### Contactgegevens vertegenwoordigers

Barenbrug Holland BV  
Postbus 1338  
6501 BH Nijmegen  
tel: 024-3488100  
e-mail: [info@barenbrug.nl](mailto:info@barenbrug.nl)  
[www.barenbrug.nl](http://www.barenbrug.nl)

Limagrain Nederland BV  
Postbus 1  
4410 AA Rilland  
tel: 0113-557100  
e-mail: [info@limagrain.nl](mailto:info@limagrain.nl)  
[www.limagrain.nl](http://www.limagrain.nl)

DSV zaden Nederland BV  
Postbus 26  
6590 AA Gennep  
tel: 0485-550610  
e-mail: [info@dsv-zaden.nl](mailto:info@dsv-zaden.nl)

Vandinter Semo BV  
Postbus 2  
9679 ZG Scheemda  
tel: 0597-591233  
e-mail: [info@vandintersemo.nl](mailto:info@vandintersemo.nl)  
[www.vandintersemo.nl](http://www.vandintersemo.nl)

DLF BV  
Postbus 1  
4420 AA Kapelle  
tel: 0113-347911  
e-mail: [info@dlf.nl](mailto:info@dlf.nl)  
[www.dlf.nl](http://www.dlf.nl)

# Appendix

English commentary and translation of terms

## Turfgrass guide

The Turfgrass Guide is an annual publication of Plantum

In the Turfgrass Guide the cultivars and mixes are classified for the following fields of use:

- Sports fields
- Lawns
- Recreation fields
- Road verges and dikes
- Golf greens

The Turfgrass Guide is based on the Dutch Turfgrass Cultivar Research. In this research the suitability of different cultivars is tested for various amenity uses. The research comes within the responsibility of Plantum.

In this research new cultivars are tested and are compared with cultivars which are already named in the Turfgrass Guide. A turfgrass cultivar is named in the Turfgrass Guide when it is proven by research that the quality of this new cultivar is equal, or better than the mean quality of the existing assortment, within the species.

An explanation of the turfgrass species and their suitability for the fields of amenity use is given in chapter 2. In chapter 3 a description of the grass seed mixtures for the fields of use is given. The lists with the named turfgrass cultivars for each field of use are stated in chapter 4. In the tables the turfgrass cultivars of the species are shown for particular uses. The cultivars that are shown below the double lining in the table will be removed from the list within three years. In some lists the latter part of the table (Nieuwe rassen) is reserved for cultivars that will be named in the next Turfgrass Guide.

In the year 2000 the quality label 'Oranjebandmengsel' (Oranjeband mixture) was introduced. 'Oranjebandmengsel®' is a hallmark of the Dutch agents/breeders for grass seed mixtures that consist exclusively of varieties that are on the Turfgrass Guide.

The hallmark is discussed in chapter 3.1.

In conclusion in chapter 5 an overview is given of the Dutch agents/breeders of the cultivars mentioned in the Turfgrass Guide.

## Translation of terms

The translation of the headings and terms used in the tables is in most cases already given in the text on previous pages. For tabel 2.1, a translation of the terms is given below:

### Field of use

- 1 Sports fields
- 2 Lawns
- 3 Landscaping
- 4 Road verges and dikes
- 5 Golf greens

### Characteristics

- 6 Kernel weight in mg
- 7 Speed of emergence
- 8 Tolerance to wear
- 9 Turf density
- 10 Short growth (high rating: slow growth)
- 11 Tolerance of short mowing
- 12 Tolerance to drought
- 13 Winter hardiness
- 14 Tolerance to shade

### Grass species

- a Perennial ryegrass diploid
- b Perennial ryegrass tetraploid
- c Smooth-stalked meadow grass
- d Chewings fescue
- e Slender creeping red fescue
- f Strong creeping red fescue
- g Hard fescue
- h Sheep's fescue
- i Browntop
- j Creeping bent

In general, a high rating is given in case of a favourable development of the character (very good=9; very bad=2).